

Tervisele ohtlikud seisundid:

Valu

- Püsiv/pikaaegne valu
Kui vastuvõtul selgub mistahes keha piirkonna pika-aegselt püsinud valu, millega klient pole meditsiinilisse kontrolli pöördunud, tuleb ta suunata arsti vastuvõtule, leidmaks valu põhjust. Olla eriti tähelepanelik, kui valu on peas, rindkeres, kõhu piirkonnas või kui urineerimisega kaasneb püsivalt valu.
- Ägedad valud, mis vajavad kindlat meditsiinilist sekkumist:
Rindkeres tekkinud äge valu õhupuudusega või ilma
Kõhupiirkonna äge valu
Peavalu, millega kaasneb oksendamine, iiveldus, valgusekartus, teadvuse muutus, vm. sümptomid
Urineerimisel tekkinud intensiivne valu
Valu liiges-lihassüsteemis, kui see takistab liikumist

Veritsemine

Kui vastuvõtul selgub mistahes veritsus, millega klient pole meditsiinilisse kontrolli pöördunud, tuleb ta suunata arsti vastuvõtule, leidmaks veritsuse põhjust.

Olla eriti tähelepanelik kui:

- veri rögas, okses, uriinis või väljaheites
- mittemenstruaalne veritsemine tupest (menstruatsioonide vahel, menopausis ja raseduse ajal)

Muud seisundid, mille korral vajab klient meditsiinilist sekkumist

Kui vastuvõtul selgub, et kliendil on esinenud või esineb allpool loetletud seisundeid või sümptome ning klient pole tekkinud seisundite järgselt meditsiinilisse kontrolli pöördunud, tuleb ta suunata arsti vastuvõtule.

- Teadvusekaotus(ed), teadvuse hägustumine, desorienteeritus ajas või kohas
- Seletamatu palavik, eriti kui see on püsiv või taastekkiiv
- Seedetrakti kaebused: pikalt kestnud või korduvad oksendamised ja /või kõhulahtisus
- Hingamistakistus sh. takistatud ninahingamine
- Neelamistakistus

Kiire (seletamatu) kaalukaotus